

CANNA TERRA

PĚSTEBNÍ PLÁN



ONLINE
PRŮVODCE
PĚSTOVÁNÍM

	VEGETATIVNÍ FÁZE				GENERATIVNÍ FÁZE						
	ZAKOŘE- NOVÁNÍ	I	II		I			II	III	IV	
DNY A TÝDNY	D1-5	D6-25	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
DOBA SVÍCENÍ V H.	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dávkování v ml na 10 l											
CANNA TERRA VEGA	32 - 49	45 - 62	54 - 71	54 - 71							
CANNA TERRA FLORES					57 - 76	57 - 76	57 - 76	57 - 76	57 - 76	34 - 53	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA CALMAG AGENT***	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
EC VODY***	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
EC ŽIVIN	0,8 - 1,2	1,1 - 1,5	1,3 - 1,7	1,3 - 1,7	1,3 - 1,7	1,3 - 1,7	1,3 - 1,7	1,7 - 2,1	1,3 - 1,7	0,8 - 1,2	
EC CELKEM	1,2 - 1,6	1,5 - 1,9	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	2,1 - 2,5	1,7 - 2,1	1,2 - 1,6	0,4

Tento pěstební plán je určen pro rostliny, které tvoří květy či plody, počínaje týden starými řízků nebo sazenicemi. Délka trvání každé fáze se může lišit v závislosti na odrůdě.

- * Pokud se substrát používá opakovaně, zdvojnásobte dávku CANNAZYM na 50 ml/10 l.
- ** Zvyšte dávku CANNABOOST na maximum 40 ml/10 l během kvetení pro extra sílu.
- *** Dávka CANNA CALMAG AGENT závisí na EC vody, která by měla být ideálně 0,2-0,4 mS/cm. Pokud má výchozí voda EC 0,0, lze Calmag aplikovat v maximální dávce, aby se dosáhlo EC 0,4 mS/cm. Pokud má výchozí voda vyšší EC než 0,0, měla by být použita nižší dávka Calmagu. Tento plán předpokládá EC vody (upravené pomocí Calmagu) 0,4 mS/cm.

Pro delší fázi růstu opakujte doporučené dávky z vegetativní fáze I (D6-25).
Pro delší fázi kvetení opakujte doporučené dávky z generativní fáze I (T3-T5).
Přidejte CANNA PK 13/14 v období 3-4 týdny před sklizní.

